



Grupo de Trabajo del Gobernador Dan McKee contra las Sobredosis

8 de octubre de 2025

Richard Leclerc; director, Rhode Island Departamento de Atención de Salud Conductual, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales (BHDDH) de Rhode Island

Jerome Larkin, MD; director, Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH)

Alex Gautieri, especialista en Trabajo Social, codirector comunitario del Grupo de Trabajo

Ana Novais, MA; secretaria adjunta, Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (EOHHS) de Rhode Island

Cathy Schultz, MPH; directora del Grupo de Trabajo, Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos (EOHHS) de Rhode Island

**RHODE
ISLAND**

Bienvenida y anuncios

Mes de la Prevención: próximos eventos

El BHDDH presenta: “Corriendo la voz y hablando de prevención”

Octubre es el Mes Nacional de la Prevención del Consumo de Sustancias

Eventos de apertura

- El gobernador Dan McKee ha declarado a octubre como el Mes Nacional de la Prevención.
- **Panel virtual sobre prevención:** Hablemos de prevención
- **Cuándo:** Miércoles 15 de octubre, a las 12 del medio día
- **Dónde:** Participe en el debate por la aplicación “Teams” o vea la transmisión en vivo desde la página de Facebook de BHDDH.

Mes de la Prevención: próximos eventos

Concientización de la comunidad

- **La Semana del Lazo Rojo, del 23 al 31 de octubre**, promueve el diálogo abierto sobre la importancia de no consumir drogas y fomenta la concientización en la comunidad.
- **Día de devolución de medicamentos: el 25 de octubre, de 10 a. m. a 2 p. m.** podrá deshacerse de forma segura y anónima de medicamentos que ya no necesita o que están vencidos.
- [Comparta su historia sobre prevención de forma anónima](#) mediante nuestra encuesta en el internet.
 - En colaboración con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Rhode Island, se proyectarán historias de prevención en pantallas públicas para crear conciencia.

Oportunidades

- [Conviértase en un especialista en prevención](#) y desempeñe un papel fundamental en las iniciativas de prevención de Rhode Island.



Puntos de retirada de
medicamentos



Historias sobre prevención



Especialista en prevención

**RHODE
ISLAND**

Únase a un Grupo de Trabajo del Gobernador contra las Sobredosis

Obtenga más información y vea todos los horarios de las reuniones en PreventOverdoseRI.org/task-force-work-groups.

Grupo de trabajo	Copresidente del organismo estatal	Copresidente de la comunidad
Prevención	Tara Cooper (RIDOH) Elizabeth Farrar (BHDDH)	Terrel Newton , Tides Family Services
Rescate	Nya Reichley (RIDOH)	Catherine Ahern , Programa de Primera Respuesta en la Comunidad de la Universidad de Rhode Island (University of Rhode Island Community First Responder Program)
Reducción de daños	Thomas Bertrand (RIDOH)	Machiste Rankin , Escuela de Salud Pública de Brown
Tratamiento	Linda Mahoney (BHDDH)	Jessica Elliott , Community Care Alliance
Grupo de trabajo familiar	Trisha Suggs (BHDDH)	Laurie MacDougall , Allies in Recovery
Recuperación	Candace Rodgers (BHDDH)	George O'Toole , Programa de Acción Comunitaria de East Bay (East Bay Community Action Program)
Personal de primero auxilios	Megan Umbriano (RIDOH)	
Igualdad racial	Monica Tavares (RIDOH)	Donna (DeeDee) Williams , Project Weber/RENEW Carlene Fonseca , The Greatest You Consulting
Grupo de Trabajo sobre Consumo de Sustancias en el Período Perinatal	Margo Katz (RIDOH)	Arlo Narva , Project Weber/RENEW

Rally4Recovery RI



(Manifestación para la recuperación Rhode Island)

Lo más destacado
de 2025

Stacey Levin

Un día fabuloso



- 12 miembros del Comité de Planificación
- Fiesta con pizza para voluntarios antes de la manifestación
- 92 voluntarios en total



79 stands de socios
comunitarios en la
Exposición para la
rehabilitación



**Feria de Empleo
10 mesas de
empleadores
en la Iniciativa de
Recuperación en
Lugares de Trabajo
Amigables**



Zona para niños

a cargo de Comunidades para las personas
(Communities 4 People)





6400
asistentes

Voluntarios de “Rally4Recovery”



Próximos eventos



- El Comité de Planificación de “Rally4Recovery” (Manifestación para la recuperación) formado por voluntarios y personal de la Comunidad de Rhode Island para la Recuperación de Adicciones (RICARES, Rhode Island Communities for Addiction Recovery Efforts), comenzará a reunirse en enero.
- ¿Se debería seguir realizando el evento “Rally4Recovery” en 195 “District Park”?

◆ Gracias al Comité de Planificación 2025

- Abbie Knapton
- Anita Nester
- Christiana Otele
- Claudia Maiorana
- Jessica Elliot
- Jessica Jean-Charles
- Kristin Phelps
- Max Bahi
- Obed Papp
- Sarah Liew
- Stacey Levin
- Tiffany Barry

Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros.

Muchas gracias.

slevin@ricares.org



Communities for Addiction Recovery Efforts

166 Valley St, Suite 105, Providence, RI 02909

Celular: 401-585-0772 | 401-475-2960 | www.ricares.org



Análisis de letalidad por sobredosis en Rhode Island: Recomendaciones para adultos mayores de 55 años

8 de octubre de 2025

Grupo de Trabajo del Gobernador Dan McKee contra las Sobredosis

Objetivos del análisis de la letalidad por sobredosis (OFR)

- Analizar las tendencias emergentes en la epidemia de sobredosis.
- Identificar puntos de prevención y carencias en las políticas, los sistemas y las operaciones vigentes.

Datos básicos del OFR

- Revisión trimestral de casos y reuniones adicionales centradas en las recomendaciones.
- Informes: trimestrales y anuales
- Miembros activos: cerca de 30

Miembros



Departamento de Salud de Rhode Island

- Equipo de coordinación
- Centro de Servicios Médicos de Urgencia (Center for Emergency Medical Services)
- Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners)
- Programa de control de medicamentos recetados (Prescription Drug Monitoring Program)
- Equipo de trabajo para la igualdad racial del grupo de trabajo

Otras agencias estatales de Rhode Island

- Departamento de Cuidados de Salud Conductual, Discapacidades del Desarrollo y Hospitales de Rhode Island (Rhode Island Department of Behavioral Healthcare, Developmental Disabilities & Hospitals)
- Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island (Rhode Island Department of Children, Youth & Families)
- Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos de Rhode Island (OHHS)

Socios comunitarios


- Representación de las familias
- Agencias de reducción de daños y apoyo para la recuperación
- Iniciativa de trabajo para la prevención del consumo de heroína y opioides (Heroin-Opioid Prevention Efforts Initiative, HOPE)
- Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva Inglaterra (New England High Intensity Drug Trafficking Area, HIDTA)
- Coalición Regional de Prevención de Rhode Island (Rhode Island Regional Prevention Coalition)
- Proveedores de tratamiento, hospitales, centros comunitarios de salud
- Programa de Socorristas Comunitarios de la Universidad de Rhode Island (University of Rhode Island Community First Responder Program)

Sobredosis mortales por categoría de edad

Enero de 2020 a diciembre de 2024



En 2024, la proporción de sobredosis entre personas **de 55 a 64 años aumentó**.






Nota: Los datos reflejan muertes por sobredosis de drogas accidentales y no incluyen suicidios, homicidios o muertes por causas indeterminadas.

Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners, OSME), Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) Datos actualizados al 30 de mayo de 2025. Preparado por Heidi Weidele.

Datos demográficos de las personas fallecidas en 2024



Entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, **113 personas** mayores de 55 años tuvieron una sobredosis mortal en Rhode Island.




Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners, OSME), Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) Datos actualizados al 30 de mayo de 2025. Preparado por Heidi Weidele.

Sustancias que contribuyeron a la causa de muerte entre personas mayores de 55 años, de enero a diciembre de 2024




Aproximadamente **8 de cada 10** sobredosis estuvieron relacionadas con una **sustancia ilícita**.



Sustancias que provocaron la muerte a personas mayores de 55 años, de enero a diciembre de 2024



Las sobredosis por consumo de estimulantes fueron más comunes entre mayores de 55 años.




Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners, OSME), Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) Datos actualizados al 30 de mayo de 2025.
Preparado por Heidi Weidele.

Nota: Los datos reflejan muertes por sobredosis de drogas accidentales y no incluyen suicidios, homicidios o muertes por causas indeterminadas. *Las sobredosis por consumo de estimulantes también incluyen las sobredosis relacionadas con cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Las sobredosis por consumo de opioides también incluyen las sobredosis relacionadas con el fentanilo, la buprenorfina y la metadona.

Sobredosis por consumo de opioides por categoría de edad de enero a diciembre de 2024



A mayor edad, las personas mostraban una probabilidad menor de experimentar una sobredosis por consumo de opioides, en comparación con las personas más jóvenes.



Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners, OSME), Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) Datos actualizados al 30 de mayo de 2025. Preparado por Heidi Weidele.

Revisión de los casos del mes de agosto de 2025



- Tema: Personas mayores de 55 años fallecidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024
- Cuatro personas fallecidas
- Se incorporaron invitados al equipo de OFR para que aportaran sus conocimientos:
 - Oficina Ejecutiva de Salud y Servicios Humanos
 - HopeHealth
 - Oficina de Envejecimiento Saludable de Rhode Island
 - Red de Información para Padres de Rhode Island

Agosto de 2025: Recomendaciones clave



Elaborar y difundir información sobre la reducción de daños adaptada específicamente a las personas mayores.

Crear y distribuir un paquete de herramientas que ayude a las personas a identificar los signos que indican que un adulto mayor tiene problemas de salud conductual.

Establecer prácticas de detección e intervención temprana para los adultos mayores que experimentan cambios en las facultades cognitivas o el comportamiento.

Fomentar el uso y el reembolso de las revisiones de medicamentos realizadas por farmacéuticos para las personas mayores que presentan un riesgo mayor de sufrir consecuencias negativas para la salud.

Otras recomendaciones clave recientes



Educar al público sobre el aumento del riesgo de sobredosis y otros efectos negativos para la salud derivados del consumo de estimulantes y las enfermedades crónicas coexistentes (es decir, diabetes, obesidad, hipertensión).

Ampliar el acceso de los habitantes de Rhode Island a los servicios de salud mediante el apoyo de programas que llevan la atención preventiva y primaria directamente a las personas de la comunidad, incluidos los servicios médicos de emergencia (SME), la salud móvil integrada (MIH) y los programas de asistencia médica en la calle.

Proporcionar acceso a la naloxona en todos los baños públicos, especialmente en aquellos que ofrecen mayor privacidad (p. ej.: baños portátiles, tiendas de comestibles, centros comerciales).

Próximos pasos



- Seguir compartiendo las recomendaciones de OFR e integrarlas en la planificación estratégica del RIDOH.
- Seguir colaborando con el Grupo de Trabajo del Gobernador contra la Sobredosis para garantizar que se incorporen las recomendaciones y que estas sean coherentes con las iniciativas estatales de prevención contra las sobredosis.
- Apoyar las oportunidades de colaboración para actuar en base a las recomendaciones.

Cómo puede involucrarse



Use el OFR
como fuente de
datos.

Sugiera temas
para la revisión
de casos.

Incorpórese
como voluntario
al equipo de
OFR.



Heather Coia, magíster en Trabajo Social, trabajadora social clínica independiente certificada

Coordinadora del análisis de letalidad por sobredosis (OFR)

Programa de prevención contra la sobredosis de sustancias (Drug Overdose Prevention Program)

Departamento de Salud de Rhode Island

Heather.Coia@health.ri.gov

Heidi Weidele, magíster en Salud Pública

Epidemióloga principal en sobredosis fatales

Programa de epidemiología sobre el consumo de sustancia (Substance Use Epidemiology Program)

Departamento de Salud de Rhode Island

Heidi.Weidele@health.ri.gov



Campaña de concientización pública de Rhode Island *"No importa por qué consumes"*

8 de octubre de 2025

Grupo de Trabajo del Gobernador Dan McKee contra las Sobredosis

**RHODE
ISLAND**




No importa por qué consumes

**Campaña de concientización pública sobre la
prevención de las sobredosis para los
habitantes de Rhode Island mayores de 45 años**

**RHODE
ISLAND**

Desarrollo estratégico de campañas estatales



**Datos del
RIDOH**



**Opiniones de
personas con
experiencia e
investigación
formativa**



**Desarrollo
de
conceptos y
mensajes**



**Compra de
medios y tácticas
de marketing
basadas en
pruebas**

Usamos los datos de sobredosis mortales de 2024 para impulsar medidas



Los datos de 2024 de la Oficina de Médicos Forenses del Estado del RIDOH indican que:

- **El 60 % de las sobredosis mortales se produjeron en personas mayores de 45 años.** *Este dato destaca la urgencia de realizar intervenciones específicas para esta población.*
- **La población negra no hispana de Rhode Island sigue presentando la tasa más alta de sobredosis mortal.** *En este grupo, se registraron más muertes por sobredosis relacionadas con cocaína y otros estimulantes que entre las personas hispanas o latinas y las personas blancas no hispanas.*
- **Los estimulantes, como la cocaína, el crack, la metanfetamina y las anfetaminas, estuvieron involucrados en el 65 % de las sobredosis mortales,** Esto se traduce en una creciente preocupación para la salud pública, que abarca más que los opioides. *La proporción de sobredosis que involucran estimulantes sigue aumentando.*
- **El fentanilo contribuyó al 57 % de las sobredosis mortales,** una disminución con respecto a los años anteriores, *aunque sigue siendo la principal causa de muerte por sobredosis.*

**El año pasado en
Rhode Island...**

7 de cada 10
muertes por sobredosis
involucraron
más de una clase
de sustancia.

Las sustancias incluyeron las siguientes: Alcohol, antidepresivos, antipsicóticos, barbitúricos, benzodiacepinas, opioides, medicamentos de venta libre, estimulantes y otras drogas.

Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (Office of State Medical Examiners, OSME), Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode Island Department of Health, RIDOH) Datos actualizados al 30 de mayo de 2025. Preparado por Heidi Weidele.

Nota: Los datos reflejan muertes por sobredosis de drogas accidentales y no incluyen suicidios, homicidios o muertes por causas indeterminadas.



Colaboración federal y estatal con alianzas comunitarias sólidas



RHODE ISLAND OFFICE OF
HealthyAging



Investigación formativa de la campaña

**RHODE
ISLAND**

Objetivos de la investigación:



Comprender

Comprender mejor el consumo de opioides, estimulantes y el posible uso de múltiples sustancias.



Explorar

Explorar los efectos de afecciones coexistentes y problemas de salud mental.



Identificar

Identificar formas de integrar a cuidadores y familiares en los mensajes, actividades creativas e iniciativas de divulgación.



Descubrir

Descubrir maneras eficaces de llegar a las personas que consumen sustancias, sus allegados y familiares, especialmente quienes viven el hogar (donde ocurre la mayoría de las sobredosis mortales).

Entrevistados clave:



Trabajador social con licencia

Trabajador de salud con licencia de la comunidad

**Director de
reducción de daños**

**Persona con 3 años
de recuperación**

**Trabajador
especializado**

**Director de centro de
recuperación**

Director de servicios comunitarios

**Acompañante de
recuperación de
persona a persona**

Exdocente de educación infantil temprana

**Especialista certificado en la
recuperación de persona a persona**

Profesional con licencia en dependencia química

**Persona con 23 años
de recuperación**

**Persona en
recuperación a
largo plazo**

**Persona con 10 años de
recuperación**

Médico

Consejero certificado en consumo de sustancias

**Profesional de salud
pública**

Testimonios de participantes en la investigación



“Entre los 45 y 64 años, me preguntaba qué había logrado. Me sentía desanimado, no encajaba en la sociedad ni confiaba en el sistema; sentía que históricamente el sistema no había respondido a nuestras necesidades [hombres de color]”.

“La verdad es que sentimos el estigma; lo notamos en sus expresiones y en sus rostros”.

“Las personas vuelven a consumir cuando atraviesan situaciones de estrés emocional. La mayoría tiene algún tipo de problema de salud mental”.

“Es probable que el grupo de 45 a 64 años ya no tenga relación con su familia o esté aislado, además de pertenecer a una generación que no suele ocuparse de la salud mental”.

Recomendaciones de los participantes de la investigación



El mensaje de la campaña debe:

- Informar de forma directa y clara, sin generar miedo.
- Abordar la negación o la falta de conciencia, educando sobre los riesgos de los hábitos que pueden parecer inofensivos (como las combinaciones de drogas peligrosas).
- Transmitir un mensaje humano, que haga sentir a las personas seguras, acogidas y comprendidas para que puedan abrirse a nivel emocional.
- Decir: “Podemos ayudarte. No estás solo/a. Pide ayuda cuando la necesites”.

Concepto de la campaña elegido por unanimidad



Todo comenzó por mi lesión.

Las personas mayores que consumen drogas, por cualquier motivo, corren un mayor riesgo de sufrir una sobredosis.

La ayuda y la esperanza están aquí.

PREVENT OVERDOSE RI 



Todo comenzó por mi ansiedad.

Las personas mayores que consumen drogas, por cualquier motivo, corren un mayor riesgo de sufrir una sobredosis.

La ayuda y la esperanza están aquí.

PREVENT OVERDOSE RI 



Todo comenzó por mi soledad.

Las personas mayores que consumen drogas, por cualquier motivo, corren un mayor riesgo de sufrir una sobredosis.


La ayuda y la esperanza están aquí.

PREVENT OVERDOSE RI 

Sitios del internet de la campaña (inglés y español)



PreventOverdoseRI.org





PrevengaSobredosisRI.org



Anuncios pagados

Ubicación estratégica de anuncios según los datos de sobredosis mortales de 2024 y los mapas de calor de RIDOH.



Fuente: Oficina de Médicos Forenses del Estado (OSME)

Anuncios pagos en medios digitales y redes sociales



Anuncios en aplicaciones de noticias locales, deportes y videojuegos

PREVENT OVERDOSE RI

It started because of my injury.

Older adults who use drugs — for any reason — are at greater risk of overdose. Help and hope are here.

PreventOverdoseRI.org

PREVENT OVERDOSE RI

It started because of my anxiety.

Older adults who use drugs — for any reason — are at greater risk of overdose. Help and hope are here.

PreventOverdoseRI.org

PREVENT OVERDOSE RI

It started because I'm lonely.

Older adults who use drugs — for any reason — are at greater risk of overdose. Help and hope are here.

PreventOverdoseRI.org

PREVENT OVERDOSE RI

It started because I'm grieving.

Older adults who use drugs — for any reason — are at greater risk of overdose. Help and hope are here.

PreventOverdoseRI.org

It started because I'm lonely.

Older adults who use drugs — for any reason — are at far greater risk of overdose. Help and hope are here.

PREVENT OVERDOSE RI

PreventOverdoseRI.org

Anuncios en surtidores de combustible

51 estaciones de servicio en Rhode Island



Anuncios en surtidores de combustible (español)

51 estaciones de servicio en Rhode Island



Anuncios radiales locales y en streaming (inglés/español)



Esfuerzos estratégicos de relaciones públicas



Para generar más conciencia, la campaña incluye un plan de comunicación a través de los medios, que abarca lo siguiente:

- Patrocinio para el [segmento “Crisis del fentanilo” emitido el 30 de septiembre por WPRI](#)
- Un comunicado de prensa por el Mes de la Concientización sobre el Consumo de Sustancias
- Una serie de historias personales sobre recuperación
- Otras oportunidades para reducir el estigma y conectar al público con recursos locales



Alcance a la comunidad y llamado a la acción

Paquete de alcance a la comunidad: nuevas tarjetas informativas (inglés y español)

250 ubicaciones en todo Rhode Island



Entre las muertes por sobredosis* en Rhode Island,

el 61% estuvieron relacionadas con la cocaína,

el 57% con el fentanilo,

el 82% ocurrieron en el hogar

y el 100% se pudieron haber evitado.

Datos de 2024*

PREVENT OVERDOSE RI
PrevenGaNaloxonaRI.org

Reduce el riesgo de sobredosis si usted o alguien que le importa consume drogas.

- Aprenda a reconocer los signos de una sobredosis y cómo responder. Prepárese para llamar al 911.
- Tenga siempre a la mano naloxona, un medicamento que revierte las sobredosis.
- Evite consumir drogas cuando está solo. Pida a alguien que le vigile cuando consuma.
- Conéctese con servicios de cuidado para usted o un ser querido.
- Aprenda y comparta información sobre los recursos para la reducción de daños.
- Localice los servicios locales de tratamiento y apoyo para la recuperación.

Encuentre más información y recursos, incluyendo naloxona gratis y pruebas del VIH/hepatitis C, en PrevenGaNaloxonaRI.org

Among overdose deaths* in Rhode Island,

61% involved cocaine

57% involved fentanyl

82% occurred in the home

and 100% were preventable.

*2024 data

PREVENT OVERDOSE RI

Reduce the risk of overdose if you or someone you care about uses drugs.

- Learn the signs of an overdose and how to respond. Be prepared to call 911.
- Always have naloxone, an overdose-reversal medication, nearby.
- Avoid using drugs alone. Have someone check on you when you're using.
- Connect yourself or a loved one to care.
- Learn and share information about harm reduction resources.
- Locate local treatment and recovery support services.

Find more information and resources, including free naloxone and HIV/hepatitis C testing, at PreventOverdoseRI.org/help-a-loved-one

Paquete de alcance a la comunidad : Nuevo folleto tríptico (inglés y español)

250 ubicaciones en Rhode Island



English/español

It started because of my injury.

Todo comenzó por mi lesión.

It started because I'm lonely.

Todo comenzó por mi soledad.

It started because of my anxiety.

Todo comenzó por mi ansiedad.

No matter why you use drugs, help and hope are here.

No importa por qué consumes drogas, aquí puede encontrar ayuda y esperanza.

If you think someone is experiencing an opioid overdose, give them naloxone. Naloxone reverses the effects of opioids such as fentanyl, heroin, methadone, codeine, hydrocodone, and oxycodone. It does not reverse the effects of other types of drugs like alcohol, xylazine, or stimulants like cocaine or crack cocaine.

If the person has taken mixed drugs and an opioid is involved, naloxone will reverse opioid effects, but someone may continue to be sedated from the other drugs. Naloxone can help save them from brain damage or even death.

Get free overdose prevention training and naloxone at PreventOverdoseRI.org/get-naloxone

Si cree que alguien está sufriendo una sobredosis de opioides, adminístrele naloxona. La naloxona revierte los efectos de opioides como el fentanilo, la heroína, la metadona, la codeína, la hidrocodona y la oxicodona. No revierte los efectos de otros tipos de drogas como el alcohol, la xilazina o estimulantes como la cocaína o el crack.

Si la persona ha tomado una combinación de drogas y un opioide está involucrado, la naloxona revertirá los efectos opioides, pero la persona podría continuar sedada por las otras drogas. La naloxona puede ayudar a prevenir daño cerebral o incluso la muerte.

Puedes obtener capacitación gratis sobre prevención de sobredosis y naloxona en <https://tinyurl.com/yrtjznm9m>

Important information if you're over 45.

In Rhode Island, overdose deaths are rising among adults age 45 and older. It's important to know that if you're using drugs, the risk of experiencing an overdose is higher as you age.

Información importante si tienes más de 45 años.

En Rhode Island, las muertes por sobredosis están aumentando entre los adultos de 45 años o más. Es importante saber que, si consumes drogas, el riesgo de sufrir una sobredosis es mayor a medida que envejeces.

PREVENT OVERDOSE RI

PreventOverdoseRI.org
PrevengaSobredosisRI.org

PREVENT OVERDOSE RI

People who are older can have unique and sometimes complex health risks. Maybe you take a prescription to help with pain from an injury. Maybe you use other drugs to cope with stress or loneliness. And maybe you mix prescriptions with other drugs. Those substances might have dangerous interactions, which could lead to a fatal overdose.

No matter why you use, the health risks can be serious.

Thankfully, help and hope are here. If you or someone you love uses drugs, you can find local treatment, recovery, and harm reduction resources at PreventOverdoseRI.org.

Las personas mayores pueden tener riesgos de salud únicos y a veces complejos. Quizás tome algún medicamento recetado para aliviar el dolor de una lesión. Quizás use otros medicamentos para lidiar con el estrés o la soledad. Y quizás mezcle medicamentos recetados con otros medicamentos. Estas sustancias podrían tener interacciones peligrosas, lo que podría provocar una sobredosis mortal.

Sin importar por qué consume, los riesgos para la salud pueden ser graves.

Afortunadamente, la ayuda y la esperanza están aquí. Si usted o alguien a quien ama consume drogas, puede encontrar recursos locales para el tratamiento, la recuperación y la reducción de daños en PrevengaSobredosisRI.org.

How to recognize an overdose.

Know these signs of an overdose, and you could save someone's life.

- Breathing slowly. A person may have very slow, shallow breaths, make gurgling noises, or stop breathing.
- Can't be woken up. They may be awake but unable to talk or may not respond when you try to wake them up.
- Changes to skin tone. Their skin tone can turn grayish or ashen to bluish purple.

Call 911 if you're with someone you think is having an overdose.

Cómo reconocer una sobredosis.

Conoce estos signos de sobredosis y podría salvarle la vida a alguien.

- Respiración lenta. La persona puede tener una respiración muy lenta y superficial, emitir sonidos de gorgoteo o dejar de respirar.
- No se puede despertar. Puede estar despierta, pero incapaz de hablar o no responder cuando se intenta despertarla.
- Cambios en el tono de la piel. El tono de la piel puede volverse grisáceo o pálido hasta azul morado.

Llame al 911 si está con alguien que cree que está sufriendo una sobredosis.

Ayude a difundir esta nueva campaña



- **Próximamente: paquete de herramientas de la campaña.** A fin de obtener contenido para compartir, vea la edición de octubre del [boletín informativo del Grupo de Trabajo contra las Sobredosis](#).
- **Nuevos materiales impresos.** Recoja las nuevas tarjetas y los folletos trípticos en la próxima [reunión presencial del Grupo de Trabajo](#), que se realizará el 12 de noviembre.
- **Comparta el mensaje.** Difunda esta información en sus redes sociales, sitios web, boletines informativos y otros canales de comunicación.



Gracias

¿Tiene preguntas?

**RHODE
ISLAND**

Comentarios del público

RHODE
ISLAND